

**ENDOFAST**

**Gdynia ul. Rozewska 31/111**

**Imię nazwisko:**

**PESEL:**

## **ŚWIADOMA ZGODA NA ZNIECZULENIE – ANALGOSEDACJĘ DO ZABIEGU ENDOSKOPII**

Jak również towarzyszące temu niezbędne postępowanie (wkłucie dożylnie, infuzje leków i płynów infuzyjnych) w czasie trwania i po zabiegu endoskopii.

**INFORMACJE OGÓLNE:** Znieczulenie typu analgosedacja dożylna zapewnia pacjentowi bezpieczeństwo w czasie zabiegu jak i bezpośrednio po nim. Podczas analgosedacji pacjent pozostaje pod opieką lekarza anestezjologa. Podczas zabiegu pacjent nie odczuwa bólu, świadomość jest ograniczona lub całkowicie wyłączona. Przed znieczuleniem – analgosedacją pacjent jest zobowiązany do poinformowania lekarza anestezjologa o wszelkich przebytych i aktualnych współistniejących chorobach oraz wszystkich przyjmowanych preparatach leczniczych i stosowanych używkach. Warunkiem przeprowadzenia zabiegu jest zapewnienie pacjentowi opieki przez osobę towarzyszącą po wyjściu z sali zabiegowej .

**Przebieg znieczulenia – analgosedacji:** Podczas zabiegu endoskopowego lekarz anestezjolog kontroluje podstawowe funkcje życiowe pacjenta, monitorowana są parametry życiowe: czynność serca, ekg, ciśnienie tętnicze krwi, wysycenie tlenem (pulsoksymetria). Po zabiegu pacjent wypoczywa w sali obserwacyjnej pod opieką pielęgniarki anestezjologicznej. Czas obserwacji uwarunkowany jest stanem chorego oraz rodzajem wykonywanego zabiegu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek powikłań medycznych zespół anestezjologiczny prowadzi leczenie do czasu przekazania pacjenta do ośrodka specjalistycznego.

**Możliwe powikłania:** Analgosedacja – znieczulenie do zabiegu endoskopowego jak każde inwazyjne działanie lekarskie obarczone jest pewnym ryzykiem powikłań (1 : 10 000). Prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań groźnych dla życia jest znikome. Wystąpienie powikłań zależy od stanu ogólnego pacjenta (chorób przewlekłych i skuteczności ich leczenia) oraz rodzaju wykonywanego zabiegu endoskopowego.

Do rzadkich powikłań należą: reakcja alergiczna na leki włącznie ze wstrząsem anafilaktycznym, zaburzenia czynności układu oddechowego, zaburzenia rytmu serca włącznie z zatrzymaniem krążenia, nudności i wymioty. Zespół anestezjologiczny przygotowany jest do natychmiastowego leczenia powikłań.

**UWAGA:** Po zabiegu endoskopowym w analgosedacji pacjent powinien pozostawać pod opieką osoby dorosłej do dnia następnego. Nie należy w ciągu co najmniej 6 godz. podejmować ważnych życiowo decyzji. Wskazany jest również transport samochodem do domu przez inną osobę..Nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych oraz obsługiwać precyzyjnych urządzeń.

## OŚWIADCZENIE PACJENTA:

Ja niżej podpisany/a:.....  
oświadczam, że:

- uzyskałem/am pełną zrozumiałą informację o proponowanym znieczuleniu,
- miałem/am nieskrępowane możliwości zadawania pytań dotyczących planowanego postępowania anestezyjologicznego, związanego z nim ryzyka i możliwości wystąpienia powikłań
- zostałem/am poinformowany/a o konieczności przebywania w przychodni przez co najmniej 30 minut po badaniu,
- jestem z osobą towarzyszącą,
- **nie będę dzisiaj prowadził/a pojazdów mechanicznych,**
- zgadzam się na medycznie uzasadnione rozszerzenie postępowania anestezyjologicznego
- nie zataiłem żadnych istotnych informacji o stanie zdrowia, przebiegu dotychczasowego leczenia, przyjmowanych leków i używek, będąc świadomym wynikających z tego faktu konsekwencji zdrowotnych
- potwierdzam, że w ciągu 6 godzin przed planowanym znieczuleniem - analgozsedacją nie przyjmowałem żadnych pokarmów oraz w ciągu 4 godzin płynów.

.....  
(data i podpis pacjenta)

.....  
(data i podpis lekarza)

OPIS ANALGOSEDACJI (ZNIECZULENIA):